La douleur: Expérience ou sensation?

Présentée par


- Denis Arcand, M.Ps
- Alexandra Kulik, M.Ps

Définition de la douleur

- Expérience sensorielle et émotionnelle désagréable
- résultant d'une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite en de tels termes.

OUCH!!!

Modèle circulaire de la douleur



Composante nociceptive

- Activité nerveuse engendrée par une stimulation potentiellement dangeureuse pour l'organisme
- ♦ La seule activation des fibres responsables n 'est pas une condition suffisante pour = douleur
- Un seuil minimal d'activation doit être atteint
- De nombreux mécanismes peuvent bloquer les messages

Composante sensori-descriminative

- ♦ Évaluation de l'intensité de la douleur
- Implique souvent la comparaison entre différentes sensations

- Exemple des mains sur grilles thermiques
- **≻**Tens

Composante motivo-affective

- > Exemple: Accouchement
- Plus la douleur perdure plus les dimensions affectives et comportementales prennent de l'importance

Composante comportementale

 Comportements influençant le vécu douloureux

Comportements douloureux = comportements exprimant la douleur

Évitement

La composante émotivo-affective chez la personne amputée

L'amputation est une expérience au même titre que la douleur et ces 2 expériences vont avoir un impact l'une par rapport à l'autre.

Interactions

- La souffrance engendre du stress
- Le stress et les émotions ont le potentiel d'augmenter les douleurs déjà existantes
 - **≻**Souffrance
 - >Stress
 - **≻**Douleur

La composante motivoaffective

- Quel est le sens que l'on donne à ce qui nous est arrivé?
 - Exemple de la personne amputée à la guerre
- Est-ce une punition, une injustice, une fatalité, une erreur, une délivrance?

Les facteurs modifiant l'expérience

- ➤ Deuil du membre amputé
- Pertes multiples
- ➤ Modification de l'image de soi
- ➤ Souvenirs répétitifs de l'accident traumatique
- Les attentes trop élevées
- ▶La personnalité

Deuil du membre amputé

- La personne vit de la tristesse
- du déni (la prothèse va tout arranger)
- de la colère (lutte contre tout ce qui représente l'amputation dont la douleur fait partie)
- de la culpabilité (j 'aurais dû faire plus attention)

Pertes multiples

- La personne qu'elle était avant
- ➤ Son indépendance
- La satisfaction qu'elle retirait de son emploi
- >Un loisir
- Son insouciance (les choses deviennent plus compliquées)
- ➤ Son milieu de vie

Modification de l'image de soi

- La personne se préoccupe ++ de ce que les autres peuvent penser d'elle
- ► Inquiétude sur sa capacité de séduire malgré l'amputation

Souvenirs répétitifs de l'accident traumatique

De nombreuses personnes vont vivre un État de stress post traumatique après un accident ayant causé l'amputation

État de stress posttraumatique

- → Reviviscence de l 'événement traumatique
- Évitement
- Difficultés au plan du sommeil
- Irritabilité
- Difficulté de concentration
- Sursauts exagérés
- Et autres

État de stress posttraumatique

La douleur vécue lors de l'accident peut être revécue lors des flashs back

Les souvenirs ravivent le circuit de mémoire associé à l'accident dont la douleur fait partie.

État de stress posttraumatique

♦ Il est très important de dépister rapidement le ESPT afin de le traiter le rapidement possible

La personnalité

Une personnalité dramatique et anxieuse aura plus tendance à mettre le focus sur sa douleur L'objectif est que la personne comprenne ce qui influence sa douleur afin qu'elle en ait un meilleur contrôle

En conclusion

Plus les intervenants vont comprendre l'expérience douloureuse personnelle de leur client plus ils seront susceptibles d'aider la personne à gérer sa situation efficacement